

## Oseltamivir 膠囊

主成份	商品名	中文商品名	含量
Oseltamivir Phosphate	Tamiflu Capsule	克流感膠囊	75 毫克/膠囊

## 作用：

預防及治療 A 型及 B 型流行性感冒。

## 劑量與用法：

在流行性感冒症狀出現後2天內開始服用，每天二次，每次75毫克，持續五天的療程。在流行性感冒症狀出現後24小時內開始服用可達到最好的療效。空腹或在餐後服用本藥均可，如感覺腸胃不適（如噁心、嘔吐等），可與食物併服。

## 注意事項：

1. 台灣曾有 10 歲以上之未成年患者，於服用本藥後發生行為及感覺異常、幻覺、嗜睡或意識障礙等情況。在日本亦有類似案例發生。雖然這些事件與本藥間之因果關係仍未建立，使用期中應特別注意是否發生上述異常行為。對於有相關病史之高風險或已發生上述情況者，應避免使用或停用本藥。
2. 遵照醫師指示服用藥品，不要自行增減劑量；如有腎功能不佳情況，請遵照醫師指示減量。
3. 您需將整個療程的藥品服用完，不可在感覺症狀改善時，即自行停藥，否則體內的病毒可能未清除完全。
4. 應告知醫師自己是否腎功能不全、懷孕或正在授乳。
5. 本藥並不能取代老年人及危險族群每年固定的疫苗接種。
6. 一歲以下之兒童不應給予此藥品。

## 忘記用藥時該怎麼辦？

如果忘記服藥時，應儘快服用藥品。但若距離下次服藥少於兩小時，則請直接在下一次服藥時間吃藥，不要一次服用兩倍劑量。

## 此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
疼痛、咳嗽、聲音沙啞、喉嚨痛、頭暈、噁心、嘔吐、鼻塞、流鼻水、失眠；其他您認為是藥品引起的症狀	告知醫師

## 藥品該如何存放？

請參考藥袋說明。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。